

27. Clinopodium L.**Jarva**

(SPRACOVAL J. CHRTEK SEN., UPRAVILA K. ZAHRADNÍKOVÁ)

1. *Clinopodium vulgare* L.**Jarva obyčajná***Clinopodium vulgare* L. Sp. Pl. ed. 1, p. 587, 1753.Syn.: *Calamintha clinopodium* Spennér – *C. vulgaris* (L.) Halász – *Satureja vulgaris* (L.) Fritsch – *S. clinopodium* (Spennér) Caruel in Parl.

Trváca bylina s tenkým podzemkom, bez zápachu. Byl priama až vystúpavá, jednoduchá alebo málo rozkonárená, najčastejšie tupo hranatá, na báze niekedy drevnatéjúca, (10–)15–45(–80) cm vysoká, odstávajúco roztrúsene dlho chlpatá až husto plstnatá. Listy stopkaté, stopky 0,3–0,7(–10) cm dlhé, čepeľ vajcovitá, až široko vajcovitá, vzácnejšie podlhovastá, na báze slabo srdcovitá alebo klinovito zúžená do stopky, na okraji celistvookrajová alebo s 12 plynkými tupými zubmi, na vrchole tupo končistá, (1,5–)2–5(–6)×1–3 cm veľká, zelená alebo sivozelená, na oboch stranách pritlačene až odstávajúco chlpatá, na líci niekedy holá, vzácne listy husto bielo plstnaté, žliazkate bodky chýbajú. Kvety krátko stopkaté (stopky 1–3 mm dlhé), v 10–20-kvetých, hustých papraslenoch v pazuchách najvyšších listieňov tvaru listov, vrcholíky v papraslenoch sediace, paprasleny navzájom oddialené alebo najmä v najvyšších častiach biele nakozené. Listenice dlhé, šidlovité, ± také dlhé ako kalich, husto chlpaté. Kalich rúrkovitý, dvojpyskový, 13-žilový, slabo ohnutý, na báze nie je vydutý, 6–10(–12) mm dlhý, zelený alebo s fialovým odtieňom, chlpatý, zuby horného pysku kalicha kratšie ako zuby dolného pysku, zuby dolného pysku dosahujú 1/2–2/3 dĺžky rúrky kalicha. Koruna 1–1,5 cm dlhá, purpurová až svetločervená, vzácnejšie ružová alebo biela, rúrka koruny dlhšia ako kalich, horný pysk koruny plynko vykrojený, dolný pysk 3-laločný, s ± rovnakými lalokmi. Tycinky 4, predný pár dlhší ako zadný. Ramená čnelky nerovnako dlhé, horné kratšie ako dolné. Tvrdky vajcovité, ± 1,2×1 mm veľké, hnedé, slabo lesklé.

C h r o m o z ó m y: $2n = 20$, okr. 8, Královský Chlmec (Hindákova in Májovský et al. Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comenianae, Bot. 16: 6, 1970).

Variabilita. Veľmi premenlivý druh v celkovom habituse, farbe a dĺžke kališných zubov. Jednotlivé odchýlky však nemajú žiadnu vyššiu taxonomickú hodnotu. Zaujímavá je však premenlivosť v ochlpení bylí a listov. Okrem typických rastlín sa vyskytujú rastliny s belavými husto plstnatými bylami a listami. Takéto morfotypy sa vyskytujú len náhodne medzi populáciami typických rastlín (napr. vrchy Burda, Dreveník a pod.). Okrem toho sa vyskytujú aj najrôznejšie prechody od roztrúsene chlpatých rastlín až po husto plstnaté. Výskyt plstnato chlpatých rastlín nesúvisí s podkladom alebo geografickým rozšírením. Celú túto problematiku bude však treba ešte ďalej študovať.